Perpignan Le 2. fevrier 1762.

~~[illegible]~~ nº. 156.

ouverture de cadavre.

Messieurs

Je sçais trop combien vous aimés les nouvelles decouvertes pour que j'hesite a vous faire part d'une maladie que je reconnus, il y a quelque tems dans un Cadavre dont je fis l'ouverture.

Il y a environ trois ans qu'une fille que sa mauvaise conduite avoit fait enfermer a l'hopital du refuge de cette Ville, fut attaquée d'une pezanteur considerable qui repondoit vis a vis la mamelle gauche entre la cinquieme et sixieme des vrayes Cotes. Pendant ce tems pour remedier a quelques Simptomes Veneriens dont elle etoit atteinte, elle fut passée par les grands remedes, et quoiqu'aprés le traitement tous les Simptomes disparussent avec la Cause, la susd. Pezanteur ne fit que croitre avec le tems.

Sept a huit mois aprés son entrée dans le susd. hopital, elle se plaignit d'une douleur avec des élancements dans la même partie ou elle sentoit la pesanteur; il est vrai que la douleur

CARCASSONNE
carton 4
nº. 45 (1)

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

repondoit depuis la même mamelle jusqu'à la partie moyenne laterale gauche et interne du Sternum, et que la malade la comparoit a des coups d'aiguille donnés par intervales; une faim canine la devora pendant un an, ce qui l'obligeois a manger copieusement, et peu de tems aprés sa refection elle etoit forcée de se presenter a la selle pour rendre des excrements qui n'étoient pas a moitié digerés; son pouls etoit lent et entrecoupé: Elle etoit dans un Etat de Langueur qui faisoit pitié et elle etoit attaquée de foiblesses d'Estomac Et de Sincopes momentanées dont Elle revenoit avec facilité. Elle ne pût garder dans le Lit d'autre situation, pendant tout ce tems que celle d'Etre assise un peu penchée En arriere sur le Coté gauche: Cette douleur qui a duré environ deux ans, a augmenté sensiblement par degrés de même que les Sincopes, et a mesure que cette miserable approchoit de sa fin, les plaintes et les gemissements qu'elle poussoit Jour et nuit auroient attendri les Coeurs les plus endurcis. ——

Le Medecin qui dessert avec moi cette maison, eut beau employer avec les Saignées les remedes calmants et adoucissans, La douleur fut toujours la même; s'étant apperçû d'un crachement purulent qui dura pendant sept a huit Jours, il se determina a traiter cette maladie comme un ulcere dans le Poumon

Et a prescrire en consequence les remedes qui y sont propres.

Les Simptomes que J'observai, Tels que la douleur, sa Situation, les Sincopes, cette faim qui la devoroit et qui ne cessa qu'environ un mois et demi avant son decès, l'intercadence du pouls, et sa suspension d'un battement dans les vives douleurs me firent juger que quelque maladie extraordinaire affligeoient le Cœur, ou les membranes qui composent le pericarde, cependant Je n'aurois Jamais crû que cette maladie fut parvenuë dans cette partie au degré qui se manifesta par l'ouverture du Cadavre, que Je fis en presence du Sr. Beringo medecin de la d. Maison, qui l'avoit traitée dans cette maladie, Et le Sr. Borell Mre. Chirurgien mon Confrere, que Je priai d'y assister.

Aprés l'ouverture de la poitrine, dans La cavité gauche de laquelle existoient trois ou quatre Pintes d'une Liqueur sereuse, blanchatre et glaireuse, nous decouvrimes, avec surprise, un ulcere cancereux sur La substance du Cœur, qui avoit detruit non seulement Son Sac et Sa pointe, mais même une grande partie de ce Viscere musculeux, comme il est facile de le voir sur la figure ci Jointe que J'ai dessignée a cet effet. Le Pericarde etoit tout rongé a l'exception de petits Lambeaux qui existoient encore du Coté de la baze, et sur la face posterieure du Cœur.

La portion de l'ulcere qui repondoit a la partie laterale

interne et au fonds du Ventricule droit, n'avoit entre Elle et ce Ventricule que quelques fibres musculaires qui formoient une toile tres mince, que je coupai par une pression legere du doigt, cette portion qui repondoit a La partie laterale interne et au fonds du Ventricule gauche, avoit un peu plus d'Epaisseur; l'oreillete droite participoit du gonflement et de La Dureté du cœur dans le Sens que la gauche, n'en etoit pas affectée.

La Dureté du Cœur etoit Si considerable que l'Escalpel y rencontroit la resistence des cartilages, et le gonflement qu'on y remarquoit Etoit a un tel point que le Cœur avoit de circonferance au dessous des oreilletes 11. pouces 8. lignes, et aux bords de l'ulcere, 9. pouces 2 Lignes et demi.

Telle est Messieurs la maladie extraordinaire dont j'ai eté temoin, et dont j'ai crû que Vous ne trouveriés pas mauvais que je Vous fisse part. Je Serois ravi d'apprendre les reflexions que Votre sçavante société fera Sur cet Article.

J'ai l'honneur d'Etre avec Respect

Messieurs

Votre très humble Et
très obeissant serviteur
Carcassonne Me en chirurgie